

Dünen besetzten Landstreifen, die Frische Nehrung, abgehalten ist. Nur an einer Stelle der Nehrung ist eine Öffnung, durch welche das süße Wasser der Flüsse abfließt.

Durch die Schlammablagerung der einmündenden Flüsse wird das Haff immer tiechter. So sind das Frische Haff und das **Kurische Haff** (wie liegt dieses zum Frischen Haff?) nur noch 3—5 m tief. Die Halbinsel Samland, an deren Küste der Bernstein gefunden wird, trennt die beiden Haffe. (Wie lang und breit sind diese? Welches Haff ist das größere?) Schließt sich das Haff vollständig, so entsteht aus demselben ein Strandsee.

Der Nordrand des Weichseldeltas und die Frische Nehrung schließen im S die große **Danziger Bucht** ab. (Gestalt?) Der westliche Teil derselben ist das **Puziger Wiel** (wiel- und wif = Bucht), das durch die schmale, 35 km lange Halbinsel Hela, die eine ähnliche Bildung wie die Frische Nehrung ist, abgetrennt wird. (Entwirf ein Kartenbild von der besprochenen Küstenstrecke.)

Die Höhen, welche das Weichseltal im W und O einfassen, gehören dem **Pommerschen** und **Preussischen Landrücken** an, die sich durchschnittlich 100—200 m hoch erheben. (Turmberg bei Danzig aber 330, Kernsdorfer Höhe östlich von der Weichsel 310 m hoch). Sie bestehen überall aus losem Gerölle, Sand, Lehm oder Ton. In diese lockern Erdmassen sind häufig auch gewaltige Felsblöcke gebettet, die nebst den zahlreichen Seen die auffälligsten Spuren der früheren Vereisung des Gebietes sind. Die Riesengletscher der Eiszeit haben das Oberflächenbild der Landrücken oder Seenplatten streckenweise in formenreiche Hügellandschaften, in andern Gegenden aber in einförmige Sandflächen verwandelt. Die größten Seen auf dem Preussischen Landrücken sind der Mauer- und der Spirding-See.

Nach N senkt sich der Preussische Landrücken zu der Pregel- und Memelente. Fast den ganzen Wasserabfluß, der sich nach dieser Richtung bewegt, sammelt der **Pregel**, der sich aus drei Quellflüssen bildet (aus welchen?) und von S noch die Alle aufnimmt. Derselbe durchfließt ein von ziemlich bedeutenden Anhöhen eingesaßtes Wiesental und mündet unterhalb Königsberg in das Frische Haff. Die **Memel** gehört wie die Weichsel nur mit dem Unterlaufe dem Gebiet an. Vor ihrer Mündung in das Kurische Haff bildet sie ebenfalls ein Delta, indem sie sich in die Gilge und Ruß teilt.