

dem Feuerlande seiner natürlichen Beschaffenheit und seiner G. nach gleich. Östlich vom Staatenlande liegt die kleine unbewohnte Insel St. Peter, 1675 entdeckt, eine schneebedeckte Felsenwüste. Die Diego Ramirez Inseln, klein und unbewohnt unter  $56\frac{1}{2}^{\circ}$  S.

## S ü d P o l a r i n s e l n .

Neusüdschettland. Eine Gruppe von 12 Inseln und zahllosen Klippen,  $61$  bis  $62^{\circ}$  S.,  $54$  bis  $63$  W., 1819 von einem Englischen Schiffe entdeckt, aber noch nicht ganz untersucht. Mit Ausnahme einiger Gräser scheint hier gar keine Vegetation zu sein, Alles voll unzugänglicher, schneebedeckter Felsen. Die Küsten sind reich an Robbenarten und Seevögeln, unter denen der 24 F. lange Seeelefant, der 3 bis 4 Tonnen Thran giebt, die schöngeflochten Pelzrobben, der Albatros, Pinguin u. a. Wichtiger Robbengang, der aber diese Thiere bald zu vertilgen droht. Die James Insel hat einen 2500 F. hohen Berg; die Deceptions Insel hat heiße Quellen, vulkanische Steinarten und einen großen sehr geschützten Hafen. Auf der Bridgeman's Insel scheint ein rauchender Vulkan zu sein. — In S. von dieser Gruppe liegt Dreieinigkeits Land und weiter östlich noch nicht erforschte Küsten; wie denn überhaupt hier ein großer Archipelagus zu sein scheint, von dem erst einzelne Punkte, z. B. die 1821 entdeckte Krönungs Insel,  $61^{\circ} 41'$  S. mit dem guten Palmers Hafen und das noch südlichere Palmers Land. Wahrscheinlich gehören hierher die von Weddel 1822 besuchten Südkorke Inseln, ganz den vorigen gleich, höchst unwirthbare Länder mit ewigem Winter, nur von Robben und Seevögeln bewohnt. — Bellinghausen fand 1821 unter  $69\frac{1}{2}^{\circ}$  S. noch die Peters I. und Alexanders I. Insel. Am nächsten dem Südpole kam Weddel, der 1823 bis  $74^{\circ} 15'$  vordrang und das Meer Georgs IV. See nannte. — Cook, der im vorigen Jahrhundert am weitesten gegen S. vordrang, untersuchte auch das schon 1675 entdeckte Südgeorgien,  $54$  bis  $55^{\circ}$  S., eine stets mit Schnee bedeckte Insel, fast ohne Pflanzen, reich an Seevögeln, unter denen der Königs Pinguin in ganzen Heerden, ehemals auch an Seeelefanten und Pelzrobben, aber ohne Landsäugethiere; 20 Meilen lang, 2 bis 3 Meilen breit. Noch südlicher liegt das von Cook 1775 zuerst entdeckte, von Bellinghausen 1819 untersuchte Sandwich (sandwitsch) Land ( $59^{\circ} 30'$ ), 5 größere und einige kleinere Inseln, in Nebel gehüllt, ohne alle Vegetation, von ewigem Schnee bedeckt. Häufige Erscheinung des Südlichts. Keine von allen genannten Inselgruppen zeigt Spuren von menschlichen Bewohnern.