

14. Der **Marienkäfer**, **Marienschäfschen**, **Siebenpunkt**, **Sonnenkäfer**, ein niedliches Thierchen, hat 7 schwarze Punkte auf seinen rothen Flügeldecken und thut als Larve den Blattläusen großen Schaden.

15. Der **Mehlkäfer**, schwarzbraun und überall, wo sich viel Mehl befindet, dient als Larve unter dem Namen Mehlwurm den Nachtigallen zum Futter.

16. Der **Pflaster**- oder **Blasenkäfer**, **spanische Fliege**, grün, auf Flieder und Eschen, wird zu blasenziehenden Pflastern benützt.

17. Der **Bockkäfer**, **Holzbock**, **Singelkäfer** oder **Schröter**, graubraun, hat sehr lange Fühlhörner, lebt als Larve im Holze und heißt dann Holzwurm.

18. Der **Spießbock** wird  $1\frac{1}{2}$ " lang,  $\frac{1}{2}$ " breit und hat 4" lange Fühlhörner. Bei dem **Sägeschröter** sind die Fühlhörner sägeförmig.

19. Der **Gold-Laufkäfer** hat unter den schönen goldgrünen Flügeldecken gar keine Hinterflügel und kann daher bloß laufen. Er vertilgt viele schädliche Insekten.

20. Der **Schnellkäfer**, **Springkäfer** oder **Schmidt** schnell sich, auf den Rücken gelegt, in die Höhe, um auf die Füße zu kommen, weil er sich nicht umbrehen kann.

21. Der **Speckkäfer**,  $\frac{1}{3}$ " lang, schwarz, die vordere Hälfte der Flügeldecken grau mit schwarzen Pünktchen, stellt dem trockenen Fleische nach und schadet daher den Thiersammlungen.

22. Der **Pelzkäfer**, kleiner, schwarz, auf jeder Decke ein weißer Punkt, thut als Larve dem Pelzwerk großen Schaden.

23. Der **Trotzkopf**, ein kleines, schwarzbraunes Käferchen, dessen Larve in Holz und Bücher Löcher frisst, stellt sich todt, wenn man ihn berührt.

24. Der **Velkäfer** oder **Maiwurm**, schwarzblau, metallisch glänzend, sehr weich, hat einen dicken Hinterleib und kurze Flügeldecken. Er giebt einen ölichten, scharfen Saft von sich und wird gegen den Biß toller Hunde angewendet.

25. Der **Bombardirkäfer** spritzt seinen Feinden einen ähnlichen Saft entgegen.

26. Die **Wasserkäfer**, nämlich der große braunschwarze und der gelbgerandete, können sehr schnell schwimmen und nähren sich von den Larven anderer Wasserinsekten.

27. Der **Herkuleskäfer**, 3" lang, findet sich in Südamerika, wo er von Baumsaft lebt.

§. 51.

## 2. Ordnung. Halbkäfer.

(Kdrfr. I. S. 293.)

Die **Halbkäfer** haben pergamentartige Vorderflügel; die Hinterflügel fallen sich der Länge nach oder kreuzen sich. Die