

g) Familie der Köcherjungfern. Phryganites.

I. Phryganea L. — grandis.

h) Familie der Ameisenlöwen. Myrmeleonides.

I. Myrmeleo L. — formicarius, gemeiner Ameisenlöwe; die Larve in loockerer Erde an sonnigen Plätzen.

II. Ascalaphus Fabr. Falterjungfer, — barbarus, — italicus.

8te Ordnung: Schmetterlinge. Lepidoptera. Glossata
Fabr.

a) Familie der Tagsschmetterlinge, Falter. Papiliones.

I. Melitaea. — Artemis, orangegelber Falter, — cinxia, Spitzwegerich-F. — lucina, rundaugiger F. — othelio, Mittelwegerich-Falter.

II. Argynnis. — Pales, — selene, Mondfalter, — euphrosyne, Waldveischnenfalter, — dia, Hainveischnenfalter, — latonia, Ackerveischnenfalter, kleiner Perlmuttervogel, — paphia, der Silberstrich, Kaisermantel, aglaja, der große Perlmuttervogel, — adippe, der Märzveischnenfalter.

III. Vanessa, — cardui, Distelfalter, — Atalanta, der Admiral, — Io, das Tagpfauenauge, — antiopa, der Trauermantel, — polychloros, der große Fuchs, — xanthomelas, der Dotterweidenfalter, — urticae, der Wasserfalter, oder kleine Fuchs, — C album, der Cooegel, — levana, der Hasferneffelfalter, — prorsa, der Waldneffelfalter.

IV. Limenitis. — Sibilla, Heckenkirschnenfalter, — populi, Pappelvogel.

V. Apatura, — Iris, der Schillervogel; auf Weiden.

VI. Hipparchia, — Galatea, das Damenbrett, — medusa, der Blutgrasfalter, — egeria, Queckengrasfalter; und noch viele Arten.

VII. Lycaena. — Acis, vollblauer Falter, — damon, Hahnenkopf, — alsus, lasurblauer F. — corydon, silberblauer F. — alexis, Haubechelf. — adonis, himmelblauer F. — circe, kupferbrauner F. — chryseis, stahlblaustraliger F. — phlaeas, goldfarbiger F. — argus, Stechginsterf. — rubi, Brombeersf.