

- Lanius** collurio Briss., rothrückiger W. In Gebüsch, namentlich des südlichen Deutschlands.  
 — dumetorum Br., Buschwürger. In Gebüsch.  
 — minor L., rosenbrüstiger W. In Norddeutschland.  
 — nigrifrons Br., schwarzstirniger W. In Thüringen.  
 — medius Br., mittlerer W. In Norddeutschland. (Die 3 letztern unter L. minor L.)  
 — rufus Briss., rothköpfiger W. Wandert im Frühlinge und Herbst durch Mitteldeutschland.  
 — ruficeps Br., der mittlere rothköpfige W. In hügeligen Gegenden.  
 — melanotos Br., schwarzhückiger W. In baumreichen Ebenen. (Die 3 letztern unter Lanius collurio L.)

**2te Familie.** Nachtraubvögel. Eusen. Aves rapaces nocturnae.

**I. Scops** Savigny, Zwergohreule. (Strix scops L.)

- carniolica Br., die krainische Z. Auf den Alpen der Schweiz und Tirols.  
 — minuta Br., kleine Z. In Krain.

**II. Otus** Cuv. Ohreule.

- sylvestris Br., Waldohreule. In Nadelwäldern.  
 — arboreus Br., Baumohreule. Im Winter auf Bäumen.  
 — gracilis Br., schlanke O. Wie die Vorige, aber seltener. (Sämmtliche unter Strix otus L.)  
 — palustris Br., Sumpfo. In Norddeutschland.  
 — agrarius Br., Ackerohreule. Kommt im Herbst aus Dänemark nach Deutschland.

**III. Bubo** Cuv. Uhu. (Strix buho L.)

- germanicus Br., deutscher Uhu. In Felsenriffen.  
 — septentrionalis Br., nordischer U. Kommt im Winter nach Deutschland.

**IV. Syrnium** Sav. Baumkauz. (Strix L.)

- uralense Boje., uralischer B. Kommt selten nach Deutschland.  
 — macrocephalon Boje., großköpfiger B. In der Schweiz.  
 — aluco Boje., Nachtbäumkauz. In Wäldern.  
 — stridulum Br., Brandb. In Wäldern, auch in der Nähe von Häusern.