

- V. **Nyctale** Br. Nachtfauz. — **pinetorum** Br., Fichten-N. In Fichtenwäldern.
 — **abietum** Br., Tannen-N. Einzeln in Tannenwäldern.
 VII. — **planiceps** Br., plattköpfiger N. Im nordöstlichen Deutschlande. (Sämmtliche zu *Strix dasypus* Bechst. gehörig.)
 VI. **Athene** Boje. Steinfauz. — **passerina** Br., Sperlings-St. Auf Bäumen und Thürmen.
 — **psilodactyla** Br., nordischer St. Kommt im Winter nach Deutschland.
 VII. **Glaucidium** Boje. Zwergfauz. — **passerinum** Boje. (*Strix passerina* L.) europäischer Z. In Gebirgswäldern.
 VIII. **Strix** L. Schleierfauz. — **flammea** L., der deutsche S. In alten Thürmen und Schlössern.
 — **guttata** Br. (St. *flammea* L.) Perlschleierfauz. Den Winter über in Deutschland.
 IX. **Noctua** Cuv. Schneefauz. — **nyctea** Cuv. (*Strix nyctea* L.) nordischer S. Verirrt sich höchst selten aus dem Norden nach Deutschland.
 X. **Surnia** Dumeril. Habichtseule. (*Strix funerea* L.) — **funerea** Br., plattköpfige H. Im Winter bisweilen in den deutschen Wäldern.
 — **nisoria** Br., hochköpfige H. Kommt selten aus dem Norden zu uns.
 3te Familie. Tagraubvögel. **Accipitres.**
 I. **Circus** Bechst. Weihe. (*Falco* L.) — **arundinaceus** Br. (*Falco rufus* L.) Rohrweihe. Hier und da an Teichen und Seen.
 — **rufus** Briss., Rostweihe. An Teichen und Seen.
 XIV. — **cyaneus** Br. (*F. pygargus* L.) die Kornweihe. In getreidereichen Ebenen.
 — **cinereus** Br. (*F. pygargus* L.) graue Weihe. Erscheint im Herbst und Frühlinge in den Ebenen Deutschlands.